


Nieuw aanbevolen rassen van wintertarwe

Er zijn 7 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2018. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen van de rassen staan vermeld in de tabellen 1 en 2.

Baktarwe



KWS Talent kweker: KWS Lochow GmbH, Bergen (D)
vertegenwoordiger: Wiersum Plantbreeding B.V., Winschoten

RGT Libravo kweker: RAGT 2n S.A.S., Rodez (F)
vertegenwoordiger: Barenbrug Holland B.V., Nijmegen

WPB Calgary kweker: Wiersum Plantbreeding B.V., Winschoten

Vultarwe

RGT Salerno kweker: RAGT 2n S.A.S., Rodez (F)
vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

Overige tarwe

Bennington kweker: Elsoms Wheat Ltd, Lincs (UK)
vertegenwoordiger: Van de Bilt Zaden en Vlas B.V., Sluiskil /
Wiersum Plantbreeding B.V., Winschoten

Daytona kweker: Semundo B.V., Hornhuizen
vertegenwoordiger: Semundo B.V., Hornhuizen / Limagrain
Nederland B.V., Rilland

Racoon kweker: Sejet Planteforaedling, Horsens (DK)
vertegenwoordiger: Semundo B.V., Hornhuizen / Limagrain
Nederland B.V., Rilland

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. De beslissingen worden inhoudelijk voorbereid door deskundigen van het bedrijfsleven in zes gewaswerkgroepen.

Meer informatie:

Secretariaat CSAR: David Kasse, telefoon 079 – 3030 333 of 06 – 52 06 43 26

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen met bronvermelding 'CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2018'.

Tabel 1. Overzicht van de raseigenschappen bij wintertarwe*
gemiddelde resultaten over de jaren 2015 t/m 2018

Rubricering ¹⁾					Resistentie tegen						Bakkwaliteit ²⁾				Klassificatie
	Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Fusarium in de aar	Broodkwaliteit	Deegkwaliteit	Zelenywaarde	Korrelhardheid	
Baktarwe															
A Kelvin	103	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	9,0	8,0	7,0	6,5	7,5	6,5	7,0	7,0	B
A RGT Reform	95	8,0	6,5	7,0	7,0	6,5	7,5	7,0	7,0	7,0	8,0	9,5	8,0	7,0	B
N KWS Talent	110	7,5	7,5	7,0	7,0	8,0	8,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5	B
N RGT Libravo	94	7,5	7,0	7,5	7,5	8,0	6,5	7,0	6,5	7,0	7,0	7,5	7,0	6,5	B
N WPB Calgary	98	7,5	7,5	7,0	6,5	8,5	8,0	8,5	7,5	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	B
N WPB Durand	104	6,5	7,0	6,5	7,0	8,0	9,0	9,0	8,0	7,0	7,0	8,5	7,0	6,5	B
B Julius	108	8,0	6,0	5,5	7,0	6,0	6,5	7,0	7,5	7,0	8,0	7,0	8,0	8,0	B
Vultarwe															
A Stereo	93	8,0	6,5	7,0	7,0	8,0	9,0	6,0	8,0	7,0	6,5	6,5	7,0	7,0	Vu
Overige tarwe															
A Anapolis	96	7,0	6,5	7,0	7,0	8,5	6,5	8,0	6,5	7,5					
A Benchmark	103	7,5	7,0	6,5	6,5	5,0	5,5	7,5	7,0	6,5					
A Diantha	104	8,0	5,5	6,5	6,0	7,5	7,0	7,0	8,0	7,0					
A Graham	92	8,5	7,5	7,0	7,0	8,5	6,0	7,5	7,5	7,0					
A Henrik	105	7,0	6,5	7,5	6,5	8,0	6,5	7,0	7,0	7,0					
N Bennington	96	8,0	6,0	6,0	6,0	8,0	6,5	7,5	7,5	6,0					
N Racoon	100	7,5	5,5	6,0	6,0	8,5	9,0	8,0	8,5	6,5					
N WPB Ebay	98	7,5	7,0	7,0	7,0	8,5	8,5	8,5	8,5	7,0					
B Daytona	102	7,5	6,0	6,5	7,0	8,5	7,5	8,0	7,5	7,0					
B Tabasco	95	8,0	5,5	5,5	6,5	8,5	8,0	8,5	7,0	6,5					
Twee jaar onderzocht															
Amboise	83	8,5	7,0	6,5	6,5	8,0	9,0	7,0	8,5	6,0					
DSV 316127	91	8,0	5,0	5,0	6,5	8,5	8,5	7,0	9,5	6,0					
Gleam	90	8,0	6,5	7,0	6,5	8,0	6,0	6,5	7,0	6,5					
Informer	108	8,5	5,5	5,5	6,5	8,5	7,5	9,0	8,5	7,0	(7,5)	(8,5)	(8,0)	(7,5)	(B)
KWS Extase	95	8,5	8,0	7,0	7,0	8,5	7,5	8,5	8,5	6,5	(7,0)	(8,5)	(7,0)	(7,0)	(B)
KWS Fontas	106	8,5	7,0	6,5	6,5	8,0	6,0	6,0	8,0	7,0	(8,0)	(7,0)	(7,5)	(8,0)	(B)
LGWD12-11289-D	98	8,5	6,0	6,5	7,0	8,5	8,0	6,0	7,0	6,5	(6,5)	(6,0)	(6,5)	(6,5)	(Vu)
LGWD13-24587-D	107	7,5	5,5	5,5	7,5	8,0	8,0	7,5	7,5	7,0					
LGWD13-4125-SA	104	7,5	6,0	6,0	7,0	8,5	8,0	7,5	8,0	6,5	(7,0)	(5,5)	(7,0)	(7,5)	(Vu)
SEC 87-09-1a	97	8,0	8,0	7,0	6,5	8,5	8,5	9,0	7,5	6,5					
100= ..cm	88,4														

*: Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap

¹⁾ Rubricering conform de Aanbevelende Rassenlijst 2019: A= Algemeen aanbevolen ras; B= Beperkt aanbevolen ras; N= Nieuw aanbevolen ras

²⁾ Tussen haakjes: voorlopige gegevens; B = Baktarwe, Vu = Vultarwe en Ov = Overige tarwe; bij korrelhardheid betekent een cijfer hoger dan 5: een harde tarwe

Tabel 2. Overzicht van korrelopbrengsten bij wintertarwe per regio
gemiddelde resultaten over de jaren 2013 t/m 2018 in verhoudingsgetallen

	Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
Baktarwe						
A Kelvin	95	96	102	95	96	96
A RGT Reform	97	96	95	99	97	98
→ N KWS Talent	105	108	105	106	106	105
N RGT Libravo	101	102	105	98	99	100
N WPB Calgary	103	104	107	101	102	101
N WPB Durand	108	105	110	102	103	103
B Julius	93	96	90	96	99	96
Vultarwe						
A Stereo	102	101	108	100	99	101
Overige tarwe						
A Anapolis	97	94	98	100	97	99
→ A Benchmark	95	99	90	104	105	105
A Diantha	105	96	99	101	98	98
A Graham	102	103	97	100	101	100
→ A Henrik	94	97	100	99	97	98
N Bennington	102	105	98	103	103	104
N Racoon	106	106	106	99	102	101
N WPB Ebey	105	104	105	102	100	103
B Daytona	105	99	100	99	99	99
B Tabasco	91	94	101	97	98	98
Twee jaar onderzocht						
Amboise	108	102	106	100	98	97
DSV 316127	113	103	115	106	103	104
Gleam	107	104	102	107	106	106
Informer	101	105	100	103	103	102
KWS Extase	105	109	100	103	103	101
KWS Fontas	99	102	92	100	99	102
LGWD12-11289-D	112	104	106	106	104	106
LGWD13-24587-D	108	104	104	102	105	104
LGWD13-4125-SA	108	108	105	106	103	102
SEC 87-09-1a	108	103	100	100	101	99
100= .. Ton/ha	11,0	10,6	9,7	12,2	11,8	11,5

De verhoudingsgetallen bij "Met ziektebestrijding" zijn niet rechtstreeks te vergelijken met de verhoudingsgetallen bij "Zonder ziektebestrijding".